BOXFB_4416_00_PacTec

Bayer Environmental Science • AGCI • 24/11/11 • *Auteur :* Ant

Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Maxforce® QUANTUM

CONTAINS Bitrex

Toelatingsnummer : 2409B
Lokmiddel (klaar voor gebruik) op basis van 0,03% imidacloprid

4 x 30 g e

Mierenlokaas

Professioneel gebruik
Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT :

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren, inclusief de faraomier, de spookmier en de Argentijnse mier, zowel binnen als buiten.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing
Het middel is bijzonder effectief tegen faraomieren *(Monomorium phraonis)* en de zwart-bruine wegmier *(Lasius niger)*. Andere (exotische) mieren die met het middel kunnen worden bestreden zijn de spookmier *(Tapinoma melanocephalum)* en de Argentijnse mier *(Linepithema humile)*.
Maxforce Quantum is door zijn visceuze eigenschappen geschikt voor het uitzetten als lokaas, in o.a. de volgende situaties :

Opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten zoals :
Huizen en appartementen, restaurants inclusief keukens, slachthuizen, opslagplaatsen, ziekenhuizen, hotels, zwembaden, gemeentehuizen, bioscopen etc.

Buiten :
Terrassen, stoepen, toegangen tot gebouwen en garages etc.
Niet toepassen op de grond, gazons of in beplantingen.

Maxforce Quantum patronen dienen te worden gebruikt met behulp van hiervoor geschikte pistolen.
Als een patroon slechts gedeeltelijk wordt gebruikt, deze uit het pistool verwijderen en afsluiten met de bijgevoegde afsluiting.

Toepassing:
Breng het middel aan op plaatsen buiten het bereik en zicht van kinderen en (huis) dieren.
Bij gebruik binnen, de bewoners aangeven dat schoonmaken en verwijderen van lokaaspunten moet worden voorkomen. Breng het middel aan op of naast de looppaden van de mieren. Bij grote bezettingen, de lokaaspunten regelmatig controleren en verversen daar waar nodig. Voorkom het aanbrengen van het middel op zeer stoffige, vochtige of vette plaatsen of plaatsen die veelvuldig worden gewassen. Breng het middel niet aan op oppervlakten waar voedsel wordt bereid, of op oppervlakten die recent zijn behandeld met andere insecticiden of waar het lokaas kan worden vervuild met andere insecticiden.
Dosering binnen : 1 druppel per vierkante meter, bijv. behandel een keuken van 10 m² met 10 druppels of 1 druppel per strekkende meter van een mierenlooppad.

Bij gebruik buiten, kan het middel worden aangebracht in naden en kieren (op muren, tussen tegels etc.) daar waar de mieren actief zijn of waar duidelijke looppaden te zien zijn. Bij voorkeur dient het middel te worden aangebracht op plaatsen die zijn afgeschermd van regen. Onbeschutte plaatsen niet behandelen als binnen 24 uur regen wordt verwacht.
In het geval er toch regen valt binnen 24 uur, de toepassing herhalen.
Als de mierennestingangen zichtbaar zijn, het lokaas bij voorkeur rechtstreeks in deze ingangen aanbrengen.

Dosering buiten : Indien mogelijk, 2 gram van het middel rechtstreeks in het nest aanbrengen. Voor het aanbrengen op de looppaden, geldt 1 druppel per strekkende meter met een maximum van 2 gram (=10 druppels) per nest. Na 5 tot 7 dagen controleren of er nog voldoende middel beschikbaar is. Indien het lokaas volledig is verdwenen en de plaag onvoldoende bestreden is, dient de toepassing te worden herhaald. Een eerste effect op de mierenpopulatie kan worden verwacht 7 dagen na aanbrengen van het middel. De meeste mierennesten zullen na 14 dagen zijn uitgeroeid. Echter onder bepaalde omstandigheden, zoals bij erg grote nesten of bij her-infestatie, kan het plaagdierbeheersingsprogramma 2 maanden duren. Aangebrachte lokaaspunten blijven ten minste 12 weken effectief. Zo lang lokaaspunten op de juiste plaats aanwezig zijn, zal her-infestatie worden voorkomen.

Bijzondere gevaren:
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften:
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S13 Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van dierenvoeder.
S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik
S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Tel. Antigifcentrum: +32 (0) 70 245 245

Lees de bijsluiter voor meer informatie omtrent de bijzondere toepassingsvoorwaarden, de behandeling van de lege verpakking en behandelingsoverschotten, de voorzorgsmaatregelen en de aanbevelingen omtrent eerste hulp.

Lotnr. : zie verpakking
Productiedatum: zie verpakking
Uiterste houdbaarheidsdatum: productiedatum + 2 jaar

Een toelating van:
Verdeeld door:
Bayer CropScience NV/SA
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)
Tel.: +32 (0) 2 535 63 11

Bayer

Maxforce® QUANTUM

CONTAINS Bitrex

Numéro d'autorisation : 2409B
Appât (prêt à l'emploi) à base de 0,03% d'imidaclopride

4 x 30 g e

Appât fourmis

USAGE PROFESSIONNEL :
Lire le mode d'emploi avant l'utilisation.

PRESCRIPTION D'UTILISATION :
Autorisé uniquement pour la lutte contre les fourmis, y compris la fourmi pharaon, la fourmi fantôme et la fourmi argentine. Pour usage en intérieur et extérieur.

Appât insecticide réservé aux professionnels de la désinsectisation pour la lutte contre les fourmis.

Mode d'emploi
Ce produit est particulièrement efficace contre la fourmi pharaon *(Monomorium phraonis)* et la fourmi noire *(Lasius niger)*. D'autres espèces de fourmis sont aussi contrôlées par ce produit : la fourmi fantôme *(Tapinoma melanocephalum)* et la fourmi argentine *(Linepithema humile)*.
Maxforce Quantum est un liquide visqueux, conditionné dans une cartouche permettant une application précise de cet appât dans les situations suivantes.
Entrepôts, habitations et sites d'exploitation comme : Maisons et appartements, restaurants (cuisines inclues), abattoirs, entrepôts, hôpitaux, hôtels, bains publics, bâtiments municipaux, cinémas, etc.
Extérieur : Terrasses, trottoirs, patios, zones d'entrées des abris et garages, etc.
Ne pas utiliser dans le sol, pelouses et plantations.

Les cartouches de Maxforce Quantum permettent une application facile du produit en utilisant un pistolet applicateur.
Si la cartouche n'a été que partiellement utilisée, retirez-la de l'applicateur, rebouchez avec l'embout fourni et stockez-la comme indiqué.

Application
Appliquez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Utilisation intérieure : informez les résidents d'éviter de nettoyer et d'enlever les points d'appâtage. Le produit doit être appliqué sur ou à côté du cheminement des fourmis. Si l'infestation est importante, il est recommandé de ré-inspecter les points d'appâtage régulièrement et de réappliquer du produit si nécessaire. Eviter les applications dans les zones excessivement poussiéreuses, humides, graisseuses ou qui sont soumises à un nettoyage fréquent. Ne pas appliquer directement sur les zones de préparation d'aliments ou les zones récemment traitées avec un insecticide qui contaminerait l'appât.

Dose d'application à l'intérieur : 1 goutte par m² traité. Par exemple : traitement d'une cuisine de 10 m² avec 10 gouttes ou une goutte par mètre linéaire sur leur cheminement.

Utilisation extérieure : le produit peut être appliqué dans les fissures et anfractuosités (entre les briques d'un mur, aux jointures des trottoirs, etc.) où les fourmis ont été aperçues ou cheminent. Placez l'appât à l'abri de la pluie. Si la surface est exposée, ne traitez que s'il n'y a pas de prévisions de pluie dans les 24 heures. S'il pleut moins de 24 heures après traitement, réappliquez du produit. Si l'entrée du nid est visible, il est possible d'injecter le produit directement dans le tunnel d'entrée.

Dose d'application à l'extérieur : pour traitement direct du nid, injection de 2 g de produit directement dans le tunnel d'entrée. Pour application sur les cheminements, 0,2 g par mètre linéaire avec un maximum de 2 g par colonie. Contrôler après 5 à 7 jours la présence du produit. Si l'appât a complètement disparu et l'infestation persiste, veuillez répéter l'application.
Une baisse de la population et de la fréquentation de la zone traitée par les fourmis devrait être visible au bout de 7 jours après l'application.
La plupart des colonies disparaîtront en moins de 14 jours. Lors d'infestations particulièrement importantes, une ré-invasion est possible. Dans ce cas un contrôle total peut prendre jusqu'à 2 mois.
Les points d'appâtage resteront efficaces pendant au moins 12 semaines.
Tant que ces points seront présents, les ré-infestations pourront être évitées.

Risques particuliers:
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Conseils de prudence:
S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.
S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de l'utilisation.
S60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
S61 Eviter le rejet dans l'environnement. Demander la fiche de sécurité.

Tél. Centre Antipoisons: +32 (0) 70 245 245

Pour les conditions particulières d'application, le traitement des emballages vides et surplus de traitement, les mesures de précaution et les mesures de premiers soins, voir la notice ci-jointe.

N° de lot : voir emballage
Date de production: voir emballage
Date de péremption: date de production + 2 ans

Une autorisation de:
Distribué par:
Bayer CropScience NV/SA
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)
Tél.: +32 (0) 2 535 63 11

Bayer

Maxforce Quantum • 4 x 30 g • BE • *Réf. :* BE79862849B • *Article :* 79675011 • *Dim.(ouvert) :* L 379,4 mm x H 262 mm